

2 V 0000 279

MEMOIRES DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'AFRIQUE NOIRE

N° 66

LA RÉSERVE NATURELLE INTÉGRALE DU MONT NIMBA

XXIII. *DIPTERA TABANIDAE* et *GLOSSINIDAE*

par

P.-C. MOREL et M. OVAZZA

IFAN-DAKAR

Février 1963

XXIII. DIPTERA TABANIDAE ET GLOSSINIDAE

par P. C. MOREL et M. OVAZZA.

TABANIDAE.

Haematopota torquens AUSTEN, 1908.

Nimba (2 ♀♀ : X1-1946) ; sentier Yéalé-Gouéla (500 ♀♀ : 24-I-1959).

DISTRIBUTION : Guinée ; Sierra Leone ; Liberia ; Côte d'Ivoire ; Ghana.

Haematopota guineensis BIGOT, 1891.

Nzo, Yalanzou (SÉGUY, 1952 : *Chrysozona cordigera* **BIGOT**).

DISTRIBUTION : Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Nigeria ; Cameroun ; Centrafrique ; Gabon ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo (ex-belge) ; Angola ; Uganda.

Haematopota rufula (SURCOUF, 1909).

Mont Tô (SÉGUY, 1952).

DISTRIBUTION : Sierra Leone ; Guinée ; Cameroun ; Centrafrique.

Haematopota eoptica (SÉGUY, 1952) : Nzo.

Haematopota lamottei (SÉGUY, 1952) : Nion.

La description de ces deux *Haematopota* ne permet pas de les intégrer dans l'ensemble des espèces éthiopiennes du genre, tel qu'il se présente dans la monographie d'OLDROYD (1952). Il est impossible, sans revoir les types, de savoir si nous avons affaire à de bonnes espèces ou à des synonymes.

Ancala fasciata fasciata (FABRICIUS, 1775).

Ouyakoré (1 ♀ : 5-X-1956).

DISTRIBUTION : Sénégal ; Haute-Volta ; Guinée ; Sierra Leone ; Liberia ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Dahomey ; Nigeria ; Cameroun ; Centrafrique ; Gabon ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo ex-belge (Ras-Congo ; Équateur ; Ituri) ; sous-région éthiopienne occidentale.

Tabanus argenteus SURCOUF, 1907.

Ziéla (1 ♂ : 1-X-1956 (UV) ; 1 ♂ : 24-V-1936 (UV) ; 1 ♀ : 24-X-1957) ; Nimba (1 ♀ : 16-X11-1958) ; Kéoulenta, Nzo (SÉGUY, 1952).

DISTRIBUTION : Sierra Leone ; Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Nigeria ; Cameroun ; Centrafrique ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo ex-belge (Bas-Congo ; Équateur ; Kivu ; Katanga) ; Angola.

Tabanus besti SURCOUF, 1909.

Sérenghara (1 ♀ : V-1957) ; Zouguépo (1 ♀ : 11-XII-1956) ; Doromou (1 ♀ : 5-X-1956) ; Ziéla (1 ♀ : 12-IX-1956 ; 1 ♀ : 20-IX-1957 ; 1 ♀ : XI-1956) ; Gopoupleu (2 ♀♀ : 23-XII-1958) ; Oua (1 ♀ : 16-I-1959) ; Nzo, mont Tô, Yalanzou (SÉGUY, 1952).

DISTRIBUTION : bloc forestier guinéen, bloc forestier congolais ; Guinée ; Sierra Leone ; Liberia ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Nigeria ; Cameroun ; Cen trafrique ; Gabon ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo ex-belge (Kivu ; Katanga) ; Sudan ; Uganda.

Tabanus besti arbucklei AUSTEN, 1912.

Sérenghara (1 ♀ : V-1957) ; Nimba (1 ♀ : 12-V-1957, 800 m).

DISTRIBUTION : bloc forestier guinéen ; Sierra Leone ; Liberia ; Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana.

Tabanus conformis WALKER, 1848.

Ziéla (1 ♀ : 10-11-1957) ; Gopoupleu (1 ♀ : I-1959) ; Oua (2 ♀♀ : 16-I-1959).

DISTRIBUTION : Sénégal ; Gambie ; Guinée ; Sierra Leone ; Liberia ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Nigeria ; Cameroun ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo ex-belge (Bas-Congo ; Équateur ; Ituri) ; Uganda.

Tabanus fuscipleuris OLDROYD, 1954.

Ziéla (1 ♀ : 30-V-1956).

DISTRIBUTION : **bloc** forestier guinéen ; Sierra Leone ; Liberia ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Nigeria (Sud-Ouest).

Tabanus marmorosus SURCOUF, 1909.

Doromou (3 ♀♀ : 5-X-1956).

DISTRIBUTION : Sierra Leone ; Liberia ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Nigeria ; Cameroun ; Centrafrique ; Rio Muni ; Gabon ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo ex-belge (Équateur ; Ituri) ; Uganda.

Tabanus pluto WALKER, 1848.

Ziéla (1 ♀ : 25-V-1957j ; Kéoulenta, Nzo, Yalanzou (SÉGUY, 1952).

DISTRIBUTION : Sierra Leone ; Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Dahomey ; Cameroun ; Nigeria.

Tabanus ruficrus PALISOT DE BEAUVOIS, 1807.

Ziéla (1 ♀ : 30-V-1956 ; 1 ♀ : 19-X-1956 ; 1 ♀ : 24-X-1956). Camp des *Cyathea* (1 ♀ : 24-IV-1957) ; Gopoupleu (1 ♀ : 27-XII-1958) ; Kéoulenta, Nzo, Yalanzou (SÉGUY, 1952).

DISTRIBUTION : Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Nigeria ; Cameroun ; Gabon ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo ex-belge (Bas-Congo ; Équateur ; Ituri ; Kivu ; Katanga) ; Sudan ; Nyassaland ; Angola.

Tabanus ruficrus fuscomarginatus RICARDO, 1908.

Ziéla (2 ♀♀ : 24-V-1956).

DISTRIBUTION : Guinée ; Congo ex-belge (Bas-Congo ; Kivu) ; Uganda.

Tabanus secedens WALKER, 1848.Thio, Nion, Nzo, Yalanzou (SÉGUY, 1952 : *T. blanchardi* SURCOUF).

DISTRIBUTION : Sierra Leone ; Liberia ; Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Nigeria ; Cameroun ; Tchad ; Centrafrique ; Gabon ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo ex-belge (Ituri ; Kivu ; Katanga) ; Sudan ; Uganda ; Nyassaland.

Tabanus tenuipalpis AUSTEN, 1912.Nion (SÉGUY, 1952 : *T. obscurefumatus* SURCOUF).DISTRIBUTION : bloc forestier guinéen ; Sierra Leone ; Liberia ; Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana. *T. obscurefumatus* est une espèce très voisine du bloc forestier congolais.**Tabanus thoracinus** PALISOT DE BEAUVOIS, 1807.

Yalanzou (SÉGUY, 1952).

DISTRIBUTION : Sierra Leone ; Liberia ; Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Haute-Volta ; Dahomey ; Nigeria ; Cameroun ; Centrafrique ; Gabon ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo (ex-belge) ; Sudan ; Uganda ; Kenya ; Tanganyika ; Nyasaland ; Mozambique ; Rhodesia N. ; Angola.

Tabanus moreli OVAZZA, 1962,

Zouguépo (1 ♀ : 13-11-1957, 700 m).

DISTRIBUTION : Côte d'Ivoire (Mont Tonkoui).

Tabanus flavicoxa OLDROYD, 1954.

Gopoupleu (3 ♀♀ : 20-I-1959).

DISTRIBUTION : Sierra Leone ; Liberia ; Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Nigeria.

Tabanocella stimulans AUSTEN, 1910.

Ziéla (1 ♀ : 19-X-1956).

Nimba (II-VI-1942) (SÉGUY, 1952 : *T. macrorhyncha* n. sp.).

DISTRIBUTION : Sierra Leone ; Liberia ; Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Nigeria ; Cameroun ; Centrafrique ; Gabon ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo (ex-belge).

Subpangonia gravoti SURCOUF, 1909.

Kéoulenta, Yanlé (= Yéalé) (SÉGUY, 1952).

DISTRIBUTION : Sierra Leone ; Cameroun ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo (ex-belge).

GLOSSINIDAE.

Glossina fusca fusca WALTER, 1849.

Mont Tô (1 ♀ : 1X-1946) ; Nimba (1 ♀ : 1X-1946).

DISTRIBUTION : Guinée portugaise ; Guinée ; Sierra Leone ; Liberia ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Togo ; Nigeria ; Cameroun ; Centrafrique ; Gabon ; Congo (Moyen-Congo) ; Congo (ex-belge) ; Sudan ; Uganda.

Glossina pallicera BIGOT, 1891.

Nimba (500-700 m) (2 ♀♀ : 1X-1946).

DISTRIBUTION : Sierra Leone ; Liberia ; Côte d'Ivoire ; Guinée ; Ghana ; Nigeria ; Cameroun ; Gabon.

Glossina palpalis (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830).

Nimba (500-700 m) (1X-1946) : un exemplaire sans abdomen, d'où sexe indéterminable, et, partant, la sous-espèce, *p. palpalis* ou *p. gambiensis* VANDERPLANCK 1949.

DISTRIBUTION : bloc forestier guinéen, bloc forestier congolais ; la sous-espèce *gambiensis* est présente du Sénégal à la Côte d'Ivoire ; il est donc vraisemblable que les populations de *G. palpalis* du mont Nimba sont des *G. p. gambiensis*.

OUVRAGES CONSULTÉS

Tabanidae.

OLDROYD, M. A. --- The horse-flies of the ethiopian region. 1. *London* (Trustees of the British Museum), 1952, 226 p.

OLDROYD, M. A. -- *Idem*. II. *London*, 1954, 341 p.

OLDROYD, M. A. -- *Idem*. III. *London*, 1957, 489 p.

OVAZZA, M. -- Une nouvelle espèce de *Tabanus* (*Diptera* : *Tabanidae*) trouvée en Afrique occidentale : *Tabanus moreli*, n. sp. Bull. *IFAN*, t. XXIV, sér. A, n° 1, 1962.

SÉGUY, E. --- X. Diptères, p. 151-164, in : La réserve naturelle intégrale du mont Nimba. 1. *Mém. IFAN*, 1952, 19, 334 p.

Glossinidae .

BUXTON, P. A. -- The natural history of *Tsetse* Flies, *London* (H. K. Lewis & Co.), 1955, 816 p., 47 pl.

ZUMPT, F. -- Die Tsetsefliegen. *Jena* (G. Fischer), 1936, 144 p.