

2V0000871

oh

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRETARIAT D'ETAT A LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES
AGRICOLAS (I.S.R.A.)

LABORATOIRE NATIONAL DE L'ELEVAGE
ET DE RECHERCHES VETERINAIRES

871

PROMOTION LAITIERE DANS LES NIAYES

FICHE TECHNIQUE N° 4

REF, N° 136/ZOOT.
NOVEMBRE 1982.

PROMOTION LAITIERE DANS LES NIAYES

FICHE TECHNIQUE N° 4

DISTRIBUTION DE L'ALIMENT RAVAL EN FONCTION
DU POIDS, DE L'ETAT PHYSIOLOGIQUE ET DE LA
PRODUCTION LAITIERE

La quantité d'aliment distribuée doit couvrir tous les besoins de l'animal (entretien, croissance, gestation, production laitière) en évitant tout gaspillage.

Il faudra donc donner à chaque animal une quantité d'aliment qui sera fonction de son poids, de son état physiologique et de sa production.

LES données relatives aux femelles laitières de races montbéliarde et pakistanaise sont présentées respectivement aux tableaux A et B.

[illegible]

Tableau A. MONTBELIARDES

P O I D S									
400	450	500	558	600	650	700	750	800	
QUANTITE DE RAVAL									
Entretien	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
Entretien + steaming (1)	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	11,5	12	12,5
5 1 lait	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
6 1	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
7 1	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5
8 1	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5
9 1	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16
10 1	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17
11 1	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5
12 1	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
13 1	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19
14 1	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5
15 1	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5
16 1	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
17 1	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5
18 1	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
19 1	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23
20 1	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24
21 1	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
22 1	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25
23 1	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26
24 1	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5
25 1	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5

(1) Steaming : 1 mis avant le vêlage, la quantité d'aliment distribué doit être augmentée afin que l'entrée en lactation soit meilleure.

Tableau B. PAKISTANAISES

	P O I D S						
	300	350	400	450	500	550	600
	RAVAL						
Entretien	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Entration + steaming	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5
2 1	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5
3 1	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
4 1	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5
5 1	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5
6 1	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
7 1	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
8 1	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
9 1	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
10 1	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15
11 1	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5
12 1	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16
13 1	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17
14 1	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5
15 1	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5